

# A型肝炎

新竹馬偕紀念醫院 家庭醫學科

林倩如 醫師



# 肝炎 有幾種

A

B

C

D

E

**AE**

糞口傳染



食物飲用水


**BCD**

血液體液




垂直感染

# 哪裡有 A 型肝炎




# A型肝炎

## 病從口入



# A型肝炎

## 特殊途徑



# 性行為

# 共用針具

# A型肝炎

潛伏期約1個月



可能都沒有症狀

# A型肝炎症狀



沒有症狀



急性肝炎



# 急性肝炎症狀

噁心、嘔吐

疲倦、發燒

沒有食慾、腹部不適




# 急性肝炎症狀

茶色尿、黃疸

猛爆性肝炎

死亡率 3/1000






施打

A型肝炎疫苗

# 誰需要打疫苗



未曾感染過的人

餐飲業相關工作

喜歡到處旅遊者

感染高風險族群

# 誰需要打疫苗



1970年前出生的  
可能曾經感染過

終身免疫

# 疫苗施打時程

1歲以上即可施打

需打2劑，間隔6個月




# 為什麼要打疫苗

接種1劑後，約2週後產生抗體  
約95%以上可產生保護力

完成2劑後，將近100%保護力  
至少20年以上

# 疫苗副作用




注射部位疼痛、紅腫

輕微發燒、倦怠

通常2-3天會恢復





施打疫苗

注意衛生

避免高風險行為

新竹馬偕家庭醫學科

林倩如 醫師